

AUXILIUM® BARRIER

Dipmittel zur Desinfektion der Zitzen nach dem Melken

KOMPONENTE 1 - BASE: Leicht viskose, klare Flüssigkeit.
Nur mit Auxilium® Barrier Komponente 2 mischen.

Wirkstoff: Natriumchlorit. Nach Mischung mit Komponente 2 (Milchsäure) entsteht Chlordioxid. Dieses Biozid-Produkt ist registriert unter Nummer N-27883, Produktart 3 (Pt3).

Auxilium® Barrier wird zur Desinfektion der Zitzen nach dem Melken eingesetzt und hinterlässt eine filmbildende Schicht auf der Zitzenhaut, die den Strichkanal vor negativen Einflüssen von außen schützt. Auxilium® Barrier sorgt durch seine hautpflegenden Komponenten für eine geschmeidige Zitzenhaut.

WARNUNG: Von Kindern fernhalten. Kontakt mit Nahrungsmitteln vermeiden. Nicht in die Augen bringen. Bei eventuellem Kontakt sofort mit reichlich Wasser spülen und bei Augenreizung einen Arzt aufsuchen. Nach verschlucken reichlich Wasser nachtrinken, sofort Frischluft zuführen und unverzüglich einen Arzt hinzuziehen. Nach Einatmen sofort Frischluft zuführen, bei Beschwerden Arzt aufsuchen. Nach Hautkontakt sofort mit Wasser abwaschen. Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht zum Reinigen von Melkgeschirren verwenden.

VORSICHT: Nur zur äußeren Desinfektion von Zitzen nach dem Melken. Bei Frost die Kühe solange drinnen halten, bis die Zitzen vollständig trocken sind. Nur mit Auxilium® Barrier Komponente 2 mischen. Nicht mit anderen Produkten mischen.

HERSTELLUNG DER GEBRAUCHSLÖSUNG: Auxilium® Barrier Komponente 1 und Komponente 2 zu gleichen Teilen in das untere Dipbecherteil pumpen. Gut schütteln bis eine gleichmäßige goldene Farbe entsteht. Nicht verdünnen. Bitte beachten Sie, dass nur soviel Auxilium® angemischt wird, wie für einen Melkgang (von 2,5 - 3 Stunden) notwendig ist. Sollte ein Melkgang die Zeit von 3 Stunden überschreiten, muss erneut eine frische Gebrauchslösung hergestellt werden. Pro Kuh werden durchschnittlich 6-7 ml benötigt. Vor jedem Melken eine neue Mischung zubereiten. Dipober- und Dipunterbecher nach jedem Melkgang ausspülen.

ANWENDUNG: Die Zitzen direkt nach jedem Melkgang mindestens bis zur Hälfte in Auxilium® Barrier Gebrauchslösung in den Dipbecher tauchen. **NICHT ABREIBEN.** Immer frisch angemischtes, vollkonzentriertes Auxilium® Barrier Dipmittel verwenden. Wenn Produkt im Dipbecher sichtbar verschmutzt ist, Inhalt entsorgen und mit frischem Auxilium® Barrier Dipmittel auffüllen. Vor dem nächsten Melken Zitzen gründlich gemäß ordentlicher Verfahren reinigen. Einfaches Papiertuch zum Trocknen verwenden.

LAGERUNG: FROST VERMEIDEN. Frost beeinträchtigt jedoch nicht die Wirksamkeit dieses Produkts, wenn die gefrorenen Inhalte aufgetaut und ordentlich geschüttelt wurden, bevor Komponente 1 (Base) und Komponente 2 (Aktivator) gemischt werden. Bei Zimmertemperatur lagern. Vor Hitze und Sonnenlicht schützen.

PFLEGETIPP: Verschmutzte Zitzen mit Leitungswasser reinigen und mit einem Einwegpapiertuch abtrocknen. Bei Frost oder großer Kälte die Tiere drinnen halten, bis die Zitzen völlig abgetrocknet sind.

HINWEIS FÜR DEN NUTZER: Die goldene Farbe in dem gemischten Produkt verblasst mit der Zeit. Bei höheren Temperaturen geht das Verblässen schneller vonstatten; dies beeinflusst jedoch nicht die Wirksamkeit des Produkts.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Auxilium® Barrier 05/08
Rückseite Komponente 2 >>>

ACHTUNG BIOZID-PRODUKT!
Biozide sicher verwenden!
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung
und Produktinformationen lesen!




AGRIBOX®

Agri-Box B.V.
Postfach 6
NL-5080 AA Hilvarenbeek
Internet: www.agribox.com
E-mail: info@agribox.com

Gebührenfrei:
Tel.: 00800 - 2474 2698
Fax: 00800 - 2474 2693
Tel.: 0031 - 13 505 2389
Fax: 0031 - 13 505 4697

AUXILIUM® BARRIER

Dipmittel zur Desinfektion der Zitzen nach dem Melken

KOMPONENTE 2 - AKTIVATOR: Leicht bewegliche, gelbliche Flüssigkeit.
Nur mit Auxilium® Barrier Komponente 1 mischen.

Wirkstoff: Milchsäure. Nach Mischung mit Komponente 1 (Natriumchlorit) entsteht Chlordioxid. Dieses Biozid-Produkt ist registriert unter Nummer N-27883, Produktart 3 (PT3).

Auxilium® Barrier wird zur Desinfektion der Zitzen nach dem Melken eingesetzt und hinterlässt eine filmbildende Schicht auf der Zitzenhaut, die den Strichkanal vor negativen Einflüssen von außen schützt. Auxilium® Barrier sorgt durch seine hautpflegenden Komponenten für eine geschmeidige Zitzenhaut.

WARNUNG: Von Kindern fernhalten. Kontakt mit Nahrungsmitteln vermeiden. Nicht in die Augen bringen. Bei eventuellem Kontakt sofort mit reichlich Wasser spülen und bei Augenreizung einen Arzt aufsuchen. Nach verschlucken reichlich Wasser nachtrinken, sofort Frischluft zuführen und unverzüglich einen Arzt hinzuziehen. Nach Einatmen sofort Frischluft zuführen, bei Beschwerden Arzt aufsuchen. Nach Hautkontakt sofort mit Wasser abwaschen. Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht zum Reinigen von Melkgeschirren verwenden.

VORSICHT: Nur zur äußeren Desinfektion von Zitzen nach dem Melken. Bei Frost die Kühe solange drinnen halten, bis die Zitzen vollständig trocken sind. Nur mit Auxilium® Barrier Komponente 1 mischen. Nicht mit anderen Produkten mischen.

HERSTELLUNG DER GEBRAUCHSLÖSUNG: Auxilium® Barrier Komponente 1 und Komponente 2 zu gleichen Teilen in das untere Dipbecherteil pumpen. Gut schütteln bis eine gleichmäßige goldene Farbe entsteht. Nicht verdünnen. Bitte beachten Sie, dass nur soviel Auxilium® angemischt wird, wie für einen Melkgang (von 2,5 - 3 Stunden) notwendig ist. Sollte ein Melkgang die Zeit von 3 Stunden überschreiten, muss erneut eine frische Gebrauchslösung hergestellt werden. Pro Kuh werden durchschnittlich 6-7 ml benötigt. Vor jedem Melken eine neue Mischung zubereiten. Dipober- und Dipunterbecher nach jedem Melkgang ausspülen.

ANWENDUNG: Die Zitzen direkt nach jedem Melkgang mindestens bis zur Hälfte in Auxilium® Barrier Gebrauchslösung in den Dipbecher tauchen. **NICHT ABREIBEN.** Immer frisch angemischtes, vollkonzentriertes Auxilium® Barrier Dipmittel verwenden. Wenn Produkt im Dipbecher sichtbar verschmutzt ist, Inhalt entsorgen und mit frischem Auxilium® Barrier Dipmittel auffüllen. Vor dem nächsten Melken Zitzen gründlich gemäß ordentlicher Verfahren reinigen. Einfaches Papiertuch zum Trocknen verwenden.

LAGERUNG: FROST VERMEIDEN. Frost beeinträchtigt jedoch nicht die Wirksamkeit dieses Produkts, wenn die gefrorenen Inhalte aufgetaut und ordentlich geschüttelt wurden, bevor Komponente 1 (Base) und Komponente 2 (Aktivator) gemischt werden. Bei Zimmertemperatur lagern. Vor Hitze und Sonnenlicht schützen.

PFLEGETIPP: Verschmutzte Zitzen mit Leitungswasser reinigen und mit einem Einwegpapiertuch abtrocknen. Bei Frost oder großer Kälte die Tiere drinnen halten, bis die Zitzen völlig abgetrocknet sind.

HINWEIS FÜR DEN NUTZER: Die goldene Farbe in dem gemischten Produkt verblasst mit der Zeit. Bei höheren Temperaturen geht das Verblasen schneller vonstatten; dies beeinflusst jedoch nicht die Wirksamkeit des Produkts.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Auxilium® Barrier 05/08
Rückseite Komponente 1 >>>

ACHTUNG BIOZID-PRODUKT!
Biozide sicher verwenden!
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung
und Produktinformationen lesen!




AGRIBOX®

Agri-Box B.V.
Postfach 6
NL-5080 AA Hilvarenbeek
Internet: www.agribox.com
E-mail: info@agribox.com

Gebührenfrei:
Tel.: 00800 - 2474 2698
Fax: 00800 - 2474 2693
Tel.: 0031 - 13 505 2389
Fax: 0031 - 13 505 4697